

Autor: **VERÔNICA MORAES FRANCISQUINI GARDIN**
Título: **AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL ÀS GESTANTES NO PSF: O CASO DE GUAIRACÁ - PR**
Data da defesa: **26/02/2010**
Orientadora: **Prof^a Dr^a GABRIELA BITTENCOURT GONZALEZ MOSEGUI**

RESUMO

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços de assistência pré-natal do Programa Saúde da Família, oferecidos às gestantes da cidade de Guairacá (PR). Trata-se de um estudo exploratório, retrospectivo, com abordagem quantitativa, no qual foram utilizados dados referentes às gestantes atendidas no município, entre julho de 2008 e julho de 2009, coletados através da técnica de auditoria, priorizando a coleta do número de consultas, registros dos exames laboratoriais e procedimentos clínico-obstétricos realizados. A identificação do perfil sócio-demográfico das gestantes foi feita a partir do SISPRENATAL. Dados indisponíveis neste sistema foram captados nos prontuários. Como critério de avaliação da qualidade da atenção pré-natal, se empregou indicadores presentes no Programa de Humanização do Pré-natal e os desenvolvidos por Nascimento (2002) e Coutinho (2002). A amostra foi composta por 57 gestantes, sendo que 24,6% encontravam-se entre 10 a 19 anos; 70% eram brancas; 71,9% viviam na zona urbana e 52,6% eram casadas ou amasiadas, enquanto 36,8% eram solteiras e 10,5% não havia registro. Quanto à escolaridade, 57,9% possuíam instrução superior a 8ª série do ensino fundamental; 52,6% eram lavradoras; 10,5% donas de casa; 3,5% estudantes e 33,4% não tinham registro. Da totalidade da amostra, 51 gestantes (89%) procuraram atendimento pré-natal no segundo trimestre de gestação e 60% realizaram 6 ou mais consultas pré-natais; 84% tinham este dado registrado em prontuário; 58% possuíam 5 ou mais registros da idade gestacional; 72% apresentavam peso, batimentos cardíacos e pressão arterial registrados e 47% a altura uterina. Em relação à apresentação fetal, nenhum prontuário apresentou registro deste dado. No que se refere à imunização antitetânica, 42,1% necessitaram de dose de reforço e 57,9% encontravam-se imunizadas. Quanto ao registro da tipagem sanguínea ABO Rh, em 100% dos prontuários identificaram-se anotação. Os exames EAS e VDRL foram solicitados a 65% das gestantes e em 81% duas vezes ou mais. Em se tratando da adequação do processo de assistência pré-natal prestado em Guairacá, o número de consultas com a época de início foi considerado 86% intermediário, os procedimentos clínicos obstétricos obrigatórios foram 72% inadequados e os procedimentos obstétricos e exames complementares foram considerados 96% intermediários. Diante disto, constatou-se que apesar da quantidade de consultas pré-natais serem satisfatórias, a maioria das gestantes só procurou os serviços de saúde a partir do segundo trimestre, e procedimentos clínicos e obstétricos obrigatórios nem sempre foram realizados, trazendo consequências tanto para o bebê quanto para a gestante.

Palavras-chave: Programa Saúde da Família; Gravidez; Avaliação da qualidade de serviços.

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the quality of prenatal care of the Family Health Program, offered to pregnant women in the city of Guairacá (PR). This is an exploratory, retrospective, quantitative approach, where data on pregnant women in the city were used, between July 2008 and July 2009, collected through the technical audit, focusing on collecting the number of performed queries, records of laboratory exams and performed clinical-obstetric procedures. The identification of socio-demographic profile of pregnant women was made from the SISPRENATAL. Data not available in this system were obtained from medical records. As criteria for evaluating the quality of prenatal care, indicators were employed in the Humanization Program of Prenatal and in the works developed for Birth (2002) and Coutinho (2002). The sample consisted of 57 pregnant women where 24,6% of them were between 10 to 19 years, 70% were white, 71.9% lived in urban areas and 52.6% were married or lived as married, while 36.8% were unmarried and 10.5% there was not record. Regarding schooling, 57.9% had education higher than the 8th grade of elementary schools, 52.6% were farm laborer, 10.5% were housewives, 3.5% were students and 33.4% had no record. Fifty-one patients (89%) sought prenatal care in the second trimester of pregnancy and 60% received 6 or more prenatal visits, 84% were recorded in this data record, and 58% had 5 or more records of gestational age, 72% weight, 72% fetal heart rate, 72% blood pressure and 47% uterine height. In relation to fetal presentation, no medical record had this information recorded. Regarding tetanus, 42.1% required a booster dose and 57.9% were immunized. The record of the ABO blood type Rh, 100% of the records identified annotation. EAS tests and VDRL were asked to 65% of pregnant women and in 81%, twice or more. And the adequacy of the prenatal care provided at Guairacá, 86% of the consultations number with the time of onset was considered intermediate, 72% of the mandatory obstetric clinical procedures were inadequate and 96% of the obstetric procedures and other exams were considered intermediate. It was found that although the number of prenatal visits is satisfactory, the majority of the women only sought health services from the second trimester of pregnancy, and that required clinical and obstetric procedures are not always carried out with consequences for both the baby and the pregnant woman.

Keywords: Family Health Program, Pregnancy, Evaluation of the services quality.